

¿Qué enfermedades puede desarrollar como consecuencia de la mordedura de un perro?

Las mordeduras de perros no solo pueden provocar lesiones sino también diseminar gérmenes. Hasta el 18% de las mordeduras de perros se infectan. Se han detectado más de 60 tipos diferentes de bacterias en las bocas de los perros, pero solo una pequeña cantidad de esos gérmenes pueden provocarle una enfermedad.

La **rabia** es una de las enfermedades más graves que las personas pueden contraer como consecuencia de la mordedura de un perro. La rabia transmitida por perros es muy poco común en los Estados Unidos. La rabia es un virus que afecta al cerebro y puede ser mortal. La forma más común de transmisión de la rabia es mediante la mordedura de un animal infectado. La enfermedad puede prevenirse a través de la vacunación de los perros. Además, las personas mordidas por un animal con rabia deben recibir tratamiento de inmediato para prevenir la enfermedad.

Los proveedores de atención médica de Boston deben informar a la **BHPC** de todas las mordeduras de animales. La **BHPC** trabaja con proveedores de atención médica y con el **Control de Animales de Boston** para asegurar que todo el tratamiento necesario y seguimiento se haya completado.



Al igual que las personas, **los perros son muy buenos comunicadores**, pero comprender lo que expresa el rostro y el cuerpo de un perro requiere práctica. La mayoría de las personas pueden reconocer los signos de un perro agresivo que no quiere que lo toquen (muestra los dientes, gruñe). No obstante, muchas mordeduras de perro ocurren porque las personas no pudieron reconocer los signos que el perro no quiere que lo molesten, incluso cuando el perro no aparente estar enojado o molesto. Algunos signos de un perro temeroso o estresado que son fáciles de pasar por alto incluyen:

- Cabeza hacia abajo o volteada hacia un lado.
- Cola baja, entre las piernas o moviéndose débilmente.
- Boca cerrada.
- Orejas hacia atrás o hacia abajo.
- Pelo del lomo erizado, especialmente cerca de la cola.
- Cuerpo tieso o tenso, inmóvil o temblando.
- “Ojos de ballena”; el perro muestra la parte blanca de los ojos más de lo normal.
- Ladrido constante con aullidos breves y agudos.
- Actitud inquieta.
- Intento de esconderse dentro o detrás de cosas.
- Bostezo rápido.
- Babeo excesivo.
- Desinterés por la comida.
- Respiración débil o rápida.
- Comportamiento nervioso, como lamerse los labios o rascarse como si tuviera comezón.

Para obtener más información sobre la prevención de mordeduras de perro, visite nuestro [pagina de web](#).

Prevención de Mordeduras de Perro



Boston Public Health Commission
Infectious Disease Bureau
1010 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02118
www.bphc.org
617-534-5611

Cada año, en los Estados Unidos, ocurren aproximadamente 4.5 millones de mordeduras de perro. ¡Aprenda a prevenir las mordeduras de perro y a reducir el riesgo de enfermedades y lesiones!

¿Quiénes corren un mayor riesgo de sufrir una mordedura de un perro?

Los niños. El índice de lesiones relacionadas con mordeduras de perro es más elevado en niños de 5 a 9 años. Los niños son más propensos que los adultos a recibir atención médica por mordeduras de perro. Los ancianos son las segundas víctimas más comunes de mordeduras de perro.



¿Dónde ocurren las mordeduras de perro?

Más de la mitad de lesiones causadas por la mordedura de un perro ocurren en el hogar con perros conocidos. Tanto para niños como para adultos, tener un perro en el hogar está asociado con una mayor probabilidad de ser mordidos. A medida que aumenta la cantidad de perros en el hogar, también se incrementan las probabilidades de sufrir una mordedura.

Como Prevenir mordeduras de perro:

Consejos de seguridad básicos



Sí:

- Permanezca inmóvil ("quédese quieto como un árbol") cuando se le acerque un perro desconocido. Mantenga la calma.
- Evite el contacto visual directo con perros desconocidos.
- Espere a que pase el perro.
- Si un perro lo hace caer, enrósquese como una bola con la cabeza escondida y las manos sobre las orejas y el cuello.
- Informé de inmediato a un adulto acerca de perros perdidos o perros que se comportan de forma extraña.

No:

- Se acerque a un perro desconocido.
- Huya (corra) de un perro.
- Entre en pánico o haga ruidos fuertes.
- Moleste a un perro que está durmiendo, comiendo o cuidando a sus cachorros.
- Toque un perro antes de preguntarle a su dueño si puede hacerlo.
- Toque un perro sin antes permitirle que lo vea y lo huela.
- Alenté a su perro a jugar en forma agresiva.
- Permita que niños pequeños jueguen con un perro sin supervisión.



¿Qué debe hacer si lo muerde o ataca un perro?

- Si fuera posible, coloque su bolso, cartera o chaqueta entre usted y el perro para protegerse.
- Si un perro lo hace caer, enrósquese como una bola con la cabeza escondida y las manos sobre las orejas y el cuello.
- Cuando llegue a un lugar seguro, lávese inmediatamente las heridas con agua y jabón.
- Busque atención médica; podría necesitar antibióticos u otro tratamiento.
- Asegúrese de buscar atención médica de inmediato si:
 - La herida es grave (sangrado incontrolable, debilidad, dolor agudo, exposición de músculo o hueso).
 - La herida se enrojece, duele, se calienta o se hincha, o si tiene fiebre.
- Aunque el riesgo es pequeño, los perros pueden tener rabia. Si un perro lo muerde, comuníquese con su médico, con Control de Animales de Boston (Boston Animal Control) en el 617-635-5348 o con la Comisión de Salud Pública de Boston (Boston Public Health Commission, BPHC) en el 617-534-5611.
- Al informar del incidente a la BPHC o al Control de Animales de Boston, estas entidades intentarán comunicarse con el dueño del perro y asegurarse de que el animal tenga la vacuna contra la rabia al día. Esto es importante porque la persona que fue mordida podría necesitar tratamiento preventivo contra la rabia.